



ทำอย่างไรเมื่อ คนในครอบครัวป่วย ด้วยไข้เลือดออก



ป่วยไข้เลือดออกเมื่อไร ต้องรีบไปหาแพทย์



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์เฝ้าระวังและสอบสวนโรคทางสุขภาพ

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

- 1 ให้อยู่แยกต่างหาก เพื่อป้องกัน
ุงกัดแล้วไปแพร่เชื้อให้คนอื่น
- 2 ซื้อยาไปใช้เอง มาจำกัด
ุงกัดที่นอนและบริเวณที่นอนทาง
ทุกช่องทาง โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่
มาฉีดพ่นยา
- 3 ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่
เพื่อหมั่นแยกอย่างจริงจัง
โดยเปลี่ยนให้เจ้าหน้าที่
ฉีดพ่นยาตามขั้นตอน
- 4 ล้างมือหลังพาหะที่เลี้ยง
บริเวณบ้านอย่างละเอียด
แล้วกำจัดที่ลูกน้ำ และ
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- 5 ช่วงโผล่แล้วร้อน คือช่วง
อันตราย ต้องรีบกลับ
ไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาล
ให้เร็วที่สุด



ไข้สูงลอยเกิน
2 วันในกรณีป่วย
ระยะแรกๆ

กินยาและปฏิบัติตาม
ตามแพทย์สั่ง

อาการที่ต้องเฝ้าระวัง

ง่วงโง่งแล้วชัก
คือช่วงอันตราย

ซึม กระสับกระส่าย มีไข้ขึ้น แผลที่ตามโน
หรืออาเจียนเป็นเลือด ริดสีดวงขึ้นต้นตอ
ปัสสาวะขุ่นปนแดงหรือมีทรายขาว

ต้องรีบกลับไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

รณรงค์กำจัด ยุงลาย

ป้องกัน 3 โรค

- ▶ โรคไข้เลือดออก
- ▶ โรคติดเชื้ออีโซซิกา
- ▶ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

โดยยึดหลัก 3 เก็บ

1. เก็บบ้าน
ไม่ให้ยุงลายไปอยู่ตามภาชนะ
2. เก็บขยะ
เก็บขยะและภาชนะที่อาจเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย
3. เก็บน้ำ
ปิดภาชนะไม่ให้ยุงลายไปใช้เพาะขยายพันธุ์

สค.11 นครราชสีมา
<http://ddpc11.ddc.moph.go.th>
www.facebook.com/Upst11LBB Tel: 052 341 147 Fax: 052 340 340

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

สค.11 นครราชสีมา